



GREENFORT
SCIENCE FOR NATURE

GREENFORT
TRICO®
Fungicida biológico



FICHA TÉCNICA



GreenFort Trico® es un fungicida biológico a base del hongo *Trichoderma viride* que previene y controla el crecimiento de hongos fitopatógenos que generan enfermedades foliares y radiculares en tus plantas.

Por medio de su rápido crecimiento, adaptación y especificidad puede controlar el establecimiento de agentes patógenos de una manera inofensiva con el ambiente y cuidando a los polinizadores.



(81) 4780 7500

contacto@granatumbw.mx
www.greenfort.com.mx
www.granatumbioworks.com

MECANISMO DE ACCIÓN

Para controlar enfermedades GreenFort Trico® crece rápidamente ganando nutrientes y espacio a los hongos dañinos, además detecta a los patógenos y produce compuestos y enzimas que inhiben su crecimiento.


A través de su mecanismo efectivo GreenFort Trico® combate la pudrición de la raíz, las enfermedades de las plántulas, la marchitez, entre otros problemas.



Las esporas de GreenFort Trico® germinan.





El hongo se ramifica y crece en la superficie de la raíz.



GreenFort Trico® coloniza rápidamente el suelo, impidiendo que hongos fitopatógenos se establezcan.



Durante su crecimiento el hongo produce compuestos con actividad antifúngica que inhiben el crecimiento y desarrollo de microorganismos patógenos.



En presencia de un hongo dañino, GreenFort Trico® se adhiere al fitopatógeno y produce una gran cantidad de enzimas que destruyen la estructura del hongo patógeno incluyendo esporas, micelios, etc.

DOSIS Y APLICACIÓN

GreenFort Trico®

Cultivos	Enfermedades	Uso	Dosis / ha / aplicación	Frecuencia de Aplicación	Dosis total Kg totales / ha
<p>Solanáceas (Berenjena, Chiles, Jitomate, Papa, Tabaco, Tomate)</p> <p>Vid,</p> <p>Cucurbitáceas,</p> <p>Berries,</p> <p>Frutales.</p>	<p>Marchitez (<i>Fusarium spp</i>)</p> <p>Moho gris (<i>Botrytis cinerea</i>)</p>	Prevenición	2 Kg	<ul style="list-style-type: none"> · Tres aplicaciones en intervalos de 14 días · Iniciar primer aplicación al momento del transplante · Por sistema de riego o mezclado a la materia orgánica previo a la siembra 	6 Kg
		Corrección	2.5 Kg	<ul style="list-style-type: none"> · Tres aplicaciones en intervalos de 14 días · Iniciar primer aplicación al aparecer los primeros síntomas de la enfermedad · Por sistema de riego 	7.5 Kg
<p>Malváceas (Cacao)</p>	<p>Moniliasis (<i>Moniliophthora roreri</i>)</p>	Prevenición	1.5 Kg	<ul style="list-style-type: none"> · Tres aplicaciones en intervalos de 0, 15 y 45 días · Iniciar primer aplicación al aparecer los primeros síntomas de la enfermedad 	4.5 Kg
		Corrección	2.5 Kg	<ul style="list-style-type: none"> · Diluir en 200 - 400 Lt de agua · Aplicación Foliar 	7.5 Kg
<p>Rubiáceas (Cafeto)</p>	<p>Roya (<i>Hemileia vastatrix</i>)</p>	Prevenición	1.5 Kg	<ul style="list-style-type: none"> · Tres aplicaciones en intervalos de 7 días · Iniciar primer aplicación al aparecer los primeros síntomas de la enfermedad 	4.5 Kg
		Corrección	2.5 Kg	<ul style="list-style-type: none"> · Diluir en 200 - 400 Lt de agua · Aplicación Foliar 	7.5 Kg

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

INGREDIENTES ACTIVOS % p/p

Trichoderma viride 10%

(Equivalente a 100 g i.a/Kg)

Conteniendo no menos de 1.4×10^6 UFC/g

INGREDIENTES INERTES

Diluyentes, Portadores y Transportador 90%

TOTAL 100%

MÉTODO DE APLICACIÓN

GreenFort Trico® puede aplicarse de manera preventiva o correctiva vía foliar, por sistema de riego directo al drench o incorporado al sustrato antes de la siembra del cultivo.

Se recomienda utilizar GreenFort Trico® como un tratamiento preventivo y aplicarlo lo antes posible al cultivo para tener una máxima eficacia.

En caso de tener una enfermedad establecida, aplicar GreenFort Trico® según el problema para evitar la propagación y en caso de persistencia utilizarlo en conjunto a otros productos.

APLICACIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA

A Vía foliar

Las aplicaciones foliares deben realizarse en horarios en los que se eviten las altas temperaturas y radiación solar ya que puede afectar la viabilidad de GreenFort Trico®.



1. Diluir la dosis requerida con 40-80 L de agua por cada 500 gramos de producto.



2. Utilizar el equipo de aspersión de su preferencia y asperjar la solución en hojas, tallo y cuello de las plantas.

B Directo al suelo

Aplicación a través del sistema de riego



1. Diluir la dosis requerida en la cantidad de agua mínima de riego.



2. Se puede aplicar con todos los sistemas de fertirrigación.

MÉTODO DE PROTECCIÓN



GreenFort Trico®
no es tóxico.



Se recomienda el uso de guantes y mascarilla al momento de aplicar, ya que no debe ser inhalado el producto durante la aplicación.



En caso de presentar alergias cutáneas, respiratorias, molestias por ingestión accidental o por el contacto con el producto, lleve a la persona al médico.



Si entra en contacto con la piel, quite la ropa contaminada y lave la piel con agua y jabón.



Mantenga el producto alejado de los niños y animales domésticos.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO



Almacenar el producto en un área fresca, ventilada y no exponerlo a luz directa del sol.

PRESENTACIONES DISPONIBLES

500 g



  GreenFortMX

WWW.GREENFORT.COM.MX